

Листок-вкладыш – информация для пациента

Альфосфаль® , 2,08 г, гель для приема внутрь
Альфосфаль® , 2,48 г, гель для приема внутрь
действующее вещество: алюминия фосфат

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, работника аптеки или медицинской сестры.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Альфосфаль®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Альфосфаль®.
3. Прием препарата Альфосфаль®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Альфосфаль®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Альфосфаль® и для чего его применяют.

Препарат Альфосфаль® содержит действующее вещество алюминия фосфат – антацид, который нейтрализует соляную кислоту в желудке и снижает активность пепсина (фермента расщепляющего белки). Препарат Альфосфаль® обладает обволакивающим, адсорбирующим действием, сохраняя кислотность желудочного содержимого на физиологическом уровне. Образует защитный слой на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Способствует удалению токсинов, газов и микроорганизмов на всем протяжении пищеварительного тракта, нормализует транспорт содержимого по кишечнику.

Показания к применению

Препарат Альфосфаль® применяется у взрослых и детей в возрасте от 0 до 18 лет.

- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка) с нормальной или повышенной секреторной функцией;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (смещение брюшной части пищевода и желудка в грудную полость через пищеводное отверстие диафрагмы);
- гастроэзофагеальный рефлюкс (состояние, при котором желудочное содержимое попадает в пищевод), рефлюкс-эзофагит (воспаление пищевода из-за заброса кислого желудочного содержимого), в том числе сопровождающийся изжогой, кислой отрыжкой;
- синдром неязвенной диспепсии (функциональное нарушение работы органов пищеварения, без образования язвенных дефектов);
- функциональный понос (диарея);
- функциональные заболевания толстой кишки;
- желудочные и кишечные расстройства, вызванные интоксикацией (отравлением), приемом лекарственных препаратов, раздражающих веществ (кислоты, щелочи), алкоголя. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Альфосфаль®. Противопоказания

Не принимайте препарат Альфосфаль®:

- если у Вас аллергия на алюминия фосфат или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас выраженные нарушения функции почек.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Альфосфаль® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, особенно если у Вас есть следующие заболевания или состояния:

- заболевания почек;
- цирроз печени (конечная стадия заболеваний печени с серьезным нарушением ее функции);
- выраженная сердечная недостаточность.

Принимайте антибиотики тетрациклиновой группы, препараты железа, сердечные гликозиды не ранее, чем через 2 часа после приема препарата Альфосфаль®.

Если при приеме препарата Альфосфаль® у Вас возникает запор, увеличьте количество ежедневно потребляемой воды.

Если Вы страдаете сахарным диабетом, то можете принимать препарат Альфосфаль®.

Лечащий врач может назначить препарат профилактически для уменьшения абсорбции радиоактивных элементов.

Прием препарата Альфосфаль® не влияет на результаты рентгенологического исследования.

Пожилые пациенты

У пожилых пациентов и больных с нарушением функции почек при приеме препарата Альфосфаль® в рекомендованных дозах возможно увеличение концентрации алюминия в сыворотке крови.

Другие препараты и препарат Альфосфаль®

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Препарат Альфосфаль® снижает эффективность действия некоторых препаратов. При приеме препарата Альфосфаль® одновременно с другими лекарственными препаратами проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом приема препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Возможно применение препарата в терапевтических дозах по показаниям лечащего врача.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Альфосфаль® не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Альфосфаль® содержит сорбитол

Если у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата.

3. Прием препарата Альфосфаль®.

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза:

Для взрослых по 1–2 пакетика 2–3 раза в сутки.

Если в промежутке между приемами препарата Альфосфаль® боли возобновляются, прием препарата следует повторить.

Применение у детей и подростков

Для детей младше 6 месяцев – ¼ пакета или 1 чайная ложка (4 г) после каждого из шести кормлений.

Для детей старше 6 месяцев – ½ пакета или 2 чайные ложки (8 г) после каждого из четырех кормлений.

Режим дозирования для детей от 6 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

Путь и (или) способ введения

Внутрь. Препарат можно принимать в чистом виде или перед приемом развести в половине стакана воды.

Схема приема зависит от характера заболевания:

- гастроэзофагеальный рефлюкс, диафрагмальная грыжа – сразу после еды и на ночь;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – через 1–2 ч после еды и немедленно при возникновении болей;
- гастрит, диспепсия – до еды;
- функциональные заболевания толстой кишки – утром натощак и на ночь.

Способ употребления

1. Тщательно размять содержимое пакета между пальцами для получения однородного геля.
2. Держа пакет вертикально, отрезать или оторвать уголок в обозначенном пунктирной линией месте.
3. Выдавить пальцами гель через отверстие в пакете.
4. Гель принимают в чистом виде или разводят перед приемом в половине стакана воды.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения препаратом для Вас определит лечащий врач. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, Вам необходимо обратиться к врачу.

Если Вы приняли препарата Альфосфаль® больше, чем следовало

Если Вы приняли больше препарата, чем следовало (передозировка), у Вас может нарушиться перистальтика кишечника (боли, вздутие живота).

В случае передозировки немедленно свяжитесь с врачом. Если есть возможность, возьмите с собой упаковку, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли. Лечащий врач может назначить Вам слабительные средства.

Если Вы забыли принять препарат Альфосфаль®

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по приему препарата, обратитесь к лечащему врачу.

Если Вы прекратили прием препарата Альфосфаль®

Продолжайте принимать этот препарат столько, сколько назначит Ваш врач. При наличии вопросов по приему препарата, обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции.

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Альфосфаль® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Альфосфаль®:

Редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000

- Запор

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом, или работником аптеки, или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Факс: +7 (495) 698-15-73

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Альфосфаль®.

Храните препарат в недоступном для детей месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не принимайте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца. При температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребует. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

Препарат Альфосфаль® содержит

Действующим веществом является алюминия фосфат.

Альфосфаль®, 2,08 г, гель для приема внутрь

Каждый пакет 16 г содержит 2,08 г алюминия фосфата (в виде алюминия фосфат гель 20 %).

Альфосфаль®, 2,48 г, гель для приема внутрь

Каждый пакет 20 г содержит 2,48 г алюминия фосфата (в виде алюминия фосфат гель 20 %).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: агар-агар, ароматизатор апельсиновый, калия сорбат, кальция сульфата дигидрат, пектин, сорбитол жидкий некристаллизующийся, хлористоводородной кислоты раствор 7 М, вода очищенная.

Внешний вид препарата Альфосфаль® и содержимое упаковки

Гель для приема внутрь

Белый или почти белый гель с запахом апельсина.

По 16 г или 20 г геля в пакет из многослойного материала (полиэтилентерефталат/фольга алюминиевая/пленка из полиэтилена низкой плотности).

По 6 или 20 пакетов вместе с инструкцией по применению (листочком-вкладышем) помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Канонфарма продакшн» (ЗАО «Канонфарма продакшн») 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.

Тел.: +7 (495) 797-99-54,

Электронный адрес: safety@canonpharma.ru

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

Закрытое акционерное общество «Канонфарма продакшн» (ЗАО «Канонфарма продакшн») 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 105.

Тел.: +7 (495) 797-99-54,

Электронный адрес: safety@canonpharma.ru

Листок-вкладыш пересмотрен 28.05.2024

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза <http://ecc.eacunion.org/>