

Терифлуномид Канон

Карточка пациента

ФИО пациента:

Дата начала приема препарата Терифлуномид Канон:

Наименование лечебного учреждения:

ФИО лечащего врача:

Номер телефона для связи с пациентом в экстренных ситуациях:

Данная Карточка пациента содержит важную информацию о рисках во время применения препарата терифлуномид. Пожалуйста, предоставьте данную карточку врачу или другому медицинскому работнику, который принимает участие в Вашем лечении (карточка может потребоваться в экстренной ситуации во время лечения).

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИЕМОМ ПРЕПАРАТА ТЕРИФЛУНОМИД КАНОН

В случае возникновения нежелательных реакций проконсультируйтесь с лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на те, которые не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории Российской Федерации:

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1

Телефон: +7 (499) 578-02-20

Электронная почта: info@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.roszdravnadzor.gov.ru.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата Терифлуномид Канон.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Терифлуноמיד Канон - это препарат, который подавляет активность иммунной системы (иммуномодулятор). У некоторых пациентов терифлуноמיד может вызывать поражение печени (гепатит), а также снижать выработку белых кровяных телец (лейкоцитов), которые участвуют в борьбе с инфекцией (нейтрофилы) и тромбоциты, которые участвуют в процессе свертывания крови. В период терапии терифлуноמידом анализы для оценки состояния печени, а также показатели артериального давления необходимо контролировать регулярно, а также при необходимости сдавать общий анализ крови. Данные анализы также необходимо сдавать перед началом лечения.

Если Вы обнаружите у себя какие-либо из указанных побочных эффектов, пожалуйста, немедленно свяжитесь с лечащим врачом:

- Симптомы поражения печени: желтизна кожи или склер (желтуха), тошнота или рвота неуточненной природы, боль в области живота, цвет мочи темнее обычного.
- Проявления инфекции, включая боль во время мочеиспускания, дезориентация, высокая температура (лихорадка), кашель, воспаленные гланды.

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ ДЕТОРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА, ВКЛЮЧАЯ ДЕВОЧЕК И ИХ РОДИТЕЛЕЙ/ОПЕКУНОВ

- Женщинам детородного потенциала следует использовать надежные методы контрацепции, так как терифлуноמיד может стать причиной появления у плода серьезных врожденных дефектов, также препарат нельзя принимать во время беременности.
- Не начинайте лечение препаратом терифлуноמיד, если Вы беременны или планируете беременность. Лечащий врач может попросить Вас сделать тест на беременность.
- Используйте эффективные методы контрацепции во время и после лечения терифлуноמידом до тех пор, пока уровень содержания препарата в крови не станет низким. Проконсультируйтесь с врачом о потенциальных рисках для будущего ребенка, а также о необходимости применения эффективных методов контрацепции.

- Сообщите врачу, если Вы хотите сменить метод контрацепции или планируете беременность после прекращения лечения препаратом Терифлуномид Канон. Вам также следует обсудить со своим врачом возможность грудного вскармливания во время приема препарата Терифлуномид Канон.
- Если Вы подозреваете о наличии беременности, либо Вы забеременели в течение 2 лет после окончания лечения препаратом Терифлуномид Канон, незамедлительно сделайте тест на беременность и обратитесь к врачу. В случае, если тест на беременность окажется положительным, врач может назначить препараты, способствующие ускоренному выведению терифлуномида из Вашего организма, поскольку это может снизить риск для вашего ребенка.
- Родители или лица, осуществляющие уход за девочками, должны обратиться к врачу своей дочери в момент начала менструального цикла, чтобы ее можно было проинформировать о риске врожденных дефектов во время беременности и дать рекомендации о необходимых средствах контрацепции.