

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**ИНСТРУКЦИЯ**  
ПО МЕДИЦИННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**АДИСОРД®**

наименование лекарственного препарата

**Регистрационный номер:** ЛП-004822

**Торговое наименование:** Адисорд®

**Международное непатентованное или  
группировочное наименование:**

нифуросазид

**Лекарственная форма:**

суспензия для приема внутрь.

**Состав**

**5 мл суспензии содержит:**

*Действующее вещество:* нифуросазид 200 мг;  
*Вспомогательные вещества:* ароматизатор банановый (эссенция банан) 0,6 мг, карбомер 971P 9 мг, лимонная кислота безводная 0,75 мг, метилпарагидроксибензоат 5 мг, натрия гидроксид 2 мг, сахараза 1000 мг, этанол 96% 0,05 мл, вода очищенная до 5 мл.

**1 флакон содержит:**

*Действующее вещество:* нифуросазид 3,6 г;  
*Вспомогательные вещества:* ароматизатор банановый (эссенция банан) 0,0108 г, карбомер 971P 0,162 г, лимонная кислота безводная 0,0135 г, метилпарагидроксибензоат 0,09 г, натрия гидроксид 0,036 г, сахараза 18 г, этанол 96% 0,9 мл, вода очищенная до 90 мл.

**Описание**

Однородная суспензия желтого цвета с ароматом банана.

**Фармакотерапевтическая группа:**

противомикробное средство, нитрофуран.

**Код АТХ:** A07AX03

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Нифуросазид - противомикробное средство, производное нитрофурана. Блокирует активность дегидрогеназ и угнетает дыхательные цепи, цикл трикарбоновых кислот и ряд других биохимических процессов в микробной клетке. Разрушает мембрану микробной клетки, снижает продукцию токсинов микроорганизмами. Высоко активен в отношении *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Shigella* spp.; *Clostridium perfringens*, *Vibrio cholerae*, патогенных *Vibrios* и *Vibrio parahaemolyticus*, *Staphylococcus* spp. Слабо чувствительны к нифуросазиду: *Citrobacter* spp., *Enterobacter cloacae* и *Proteus indologenes*. Резистентны к нифуросазиду: *Klebsiella* spp., *Proteus mirabilis*, *Providencia* spp., *Pseudomonas* spp. Не нарушает равновесие кишечной микрофлоры. При острой бактериальной диарее восстанавливает зубиоз кишечника. При инфицировании энтеротропными вирусами препятствует развитию бактериальной суперинфекции.

**Фармакокинетика**

После перорального применения нифуросазид практически не всасывается из пищеварительного тракта и свое антибактериальное действие оказывает исключительно в просвете кишечника. Нифуросазид выводится кишечником: 20 % в неизменном виде, а остальное количество нифуросазид - химически измененным.

**Показания к применению**

Острая бактериальная диарея, протекающая без ухудшения общего состояния, повышения температуры тела, интоксикации.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к нифуросазиду, к производным нитрофурана и другим компонентам препарата;

Непереносимость фруктозы;

Синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, недостаточность сахаразы и изомальтазы; Беременность;

Период новорожденности (до 1 месяца), недоношенность.

**С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, период лактации, детский возраст.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

В исследованиях на животных не было выявлено тератогенного эффекта. Однако, в качестве меры предосторожности принимать нифуросазид во время беременности не рекомендуется. Во время периода лактации возможно продолжение грудного вскармливания в случае короткого курса лечения препаратом. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы**

Применяется внутрь.

Для дозирования используется дозировочная ложка объемом 5 мл, имеющая градуировку 2,5 мл.

Перед употреблением суспензию необходимо хорошо встряхнуть.

-Детям от 1 до 6 месяцев: 100 мг нифуросазид (2,5 мл суспензии) 2-3 раза в сутки (интервал между приемами 8-12 ч).

-Детям от 6 месяцев до 3 лет: 100 мг нифуросазид (2,5 мл суспензии) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 ч).

-Детям от 3 до 6 лет: 200 мг нифуросазид (5 мл суспензии) 3 раза в сутки (интервал между приемами 8 ч).

-Детям от 6 до 18 лет: 200 мг нифуросазид (5 мл суспензии) 3-4 раза в сутки (интервал между приемами 6-8 ч).

-Взрослым: 200 мг нифуросазид (5 мл суспензии) 4 раза в сутки (интервал между приемами 6 ч).

Продолжительность курса лечения 5-7 дней, но не более 7 дней. Если в течение первых 3 дней

приема улучшения не наступило, то следует обратиться к врачу. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

#### **Побочное действие**

Аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, отек Квинке, анафилактический шок). Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

#### **Передозировка**

Симптомы передозировки неизвестны. Лечение симптоматическое.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не рекомендуется одновременное применение с препаратами, вызывающими развитие дисульфирамоподобных реакций, лекарственными препаратами, угнетающими функцию центральной нервной системы. Если Вы принимаете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Адисорд<sup>®</sup> проконсультируйтесь с врачом.

#### **Особые указания**

При лечении диареи одновременно с терапией нифуроксазидом необходимо проводить регидратационную терапию. Лечение диареи у детей до 3 лет следует проводить под наблюдением врача. В случае бактериальной диареи с признаками системного поражения (ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, симптомы интоксикации или инфекции) следует обратиться к врачу для решения вопроса о применении антибактериальных препаратов системного действия. При появлении симптомов гиперчувствительности (одышка, сыпь, зуд) следует прекратить прием препарата. Употребление алкоголя во время терапии нифуроксазидом запрещено.

В связи с содержанием метилпарагидроксибензоата препарат может вызывать аллергические реакции (возможно, отсроченные).

Препарат Адисорд<sup>®</sup> содержит 1000 мг сахарозы в 5 мл. Соответственно, содержание сахарозы в разовой дозе 2,5 мл суспензии составляет 0,04165 ХЕ (хлебных единиц), а в разовой дозе 5 мл – 0,0833 ХЕ.

Суточная доза сахарозы составляет 0,0833 ХЕ при приеме 2,5 мл суспензии 2 раза в сутки и 0,125 ХЕ при приеме 2,5 мл суспензии 3 раза в сутки.

Суточная доза сахарозы составляет 0,250 ХЕ при приеме 5 мл суспензии 3 раза в сутки и 0,333 ХЕ при приеме 5 мл суспензии 4 раза в сутки.

Содержание 96 % этанола в препарате Адисорд<sup>®</sup> суспензия составляет 1 %.

Минимальная разовая доза препарата, соответствующая 100 мг нифуроксазида (2,5 мл суспензии), содержит 0,02 г этанола (в пересчете на абсолютный спирт), и максимальная суточная доза, соответствующая 800 мг нифуроксазида (5 мл суспензии 4 раза в сутки), содержит 0,16 г этанола (в пересчете на абсолютный спирт).

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

#### **Форма выпуска**

Суспензия для приема внутрь 200 мг/5 мл. По 90 мл во флаконы медицинские из темного тарного стекла 1-го, 2-го или 3-го гидролитического класса, укуренные завинчивающимися пластиковыми крышками, обеспечивающими контроль первого вскрытия. Флакон с мерной ложкой вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (пачке картонной).

Хранить недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение**

ООО «Кронофарм», Россия.  
107014, г. Москва, ул. Бабаевская,  
д. 6, пом. IV, ком. 24.

#### **Информация об организациях, в которые могут быть направлены претензии по качеству лекарственного препарата**

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия.  
141100, Московская область, г. Щелково,  
ул. Заречная, д. 105.

Тел.: (495) 797-99-54, факс: (495) 797-96-63  
Электронный адрес: [safety@canonpharma.ru](mailto:safety@canonpharma.ru)

*Получить дополнительные данные о препарате, направить претензию на его качество, безопасность, сообщить о нежелательных лекарственных реакциях можно по телефону: 8 (800) 700-59-99 (бесплатная линия 24 часа) или на сайте [www.canonpharma.ru](http://www.canonpharma.ru) в разделе «Политика в области качества» - «Безопасность препаратов».*

#### **Производитель**

Общество с ограниченной ответственностью  
«НВЦ Агроветзащита С-П.»  
(ООО «АВЗ С-П»), Россия.  
141305, Московская обл.,  
г. Сергиев Посад,  
ул. Центральная, д. 1.