

Глицин форте, 250 мг, таблетки зашечные

Действующее вещество: глицин.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Глицин форте, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Глицин форте.
3. Прием препарата Глицин форте.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Глицин форте.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Глицин форте, и для чего его применяют

Препарат Глицин форте содержит действующее вещество глицин, относящееся к группе «другие средства для лечения заболеваний нервной системы».

Показания к применению

Препарат Глицин форте применяется у взрослых и детей в возрасте от 0 до 18 лет:

- В составе комплексной терапии ишемического инсульта.
- В составе комплексной терапии различных функциональных и органических заболеваний нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна (неврозы, невротоподобные состояния, вегетосудистая дистония, последствия нейроинфекций и черепно-мозговой травмы, перинатальные и другие формы энцефалопатий (в т.ч. алкогольного генеза)).
- В составе комплексной терапии девиантных форм поведения детей и подростков.

Способ действия препарата Глицин форте

Глицин – это аминокислота и один из основных тормозных нейромедиаторов головного мозга. Глицин нормализует и активирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.

Препарат Глицин форте обладает следующими свойствами:

- уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность, повышает социальную адаптацию;
- улучшает настроение;
- облегчает засыпание и нормализует сон;
- повышает умственную работоспособность;
- уменьшает вегетосудистые расстройства (в т.ч. во время климакса);
- уменьшает степень выраженности мозговых расстройств при ишемическом инсульте и черепно-мозговой травме;
- уменьшает токсическое действие алкоголя и других лекарственных средств, угнетающих функцию ЦНС.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Глицин форте

Противопоказания

Не принимайте препарат Глицин форте:

- если у Вас аллергия на глицин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- беременность и период грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Глицин форте проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применять с осторожностью при артериальной гипотензии (пониженном артериальном давлении).

У пациентов со склонностью к артериальной гипотензии препарат применяется в меньших дозах и под контролем артериального давления, при его снижении ниже привычного уровня прием прекращается.

Дети и подростки

Глицин эффективен у маленьких детей. Следует соблюдать осторожность при применении этого препарата у детей до трех лет.

Другие препараты и препарат Глицин форте

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Глицин ослабляет выраженность побочных эффектов антипсихотических лекарственных средств (нейролептиков), анксиолитиков, антидепрессантов, снотворных и противосудорожных средств.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Препарат противопоказан при беременности, в связи с отсутствием достаточного количества данных о безопасности применения препарата в период беременности.

Грудное вскармливание

Препарат противопоказан в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием достаточного количества данных о безопасности применения препарата в период грудного вскармливания.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

При приеме препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Глицин форте содержит аспартам

Данный лекарственный препарат содержит 0,4 мг аспартама в каждой таблетке. Аспартам является источником фенилаланина. Он может быть вреден, если у Вас фенилкетонурия (ФКУ) – редкое генетическое нарушение, при котором накапливается фенилаланин из-за неспособности организма правильно выводить его.

Препарат Глицин форте содержит сорбитол

Данный лекарственный препарат содержит 8,0 мг сорбитола в каждой таблетке.

3. Прием препарата Глицин форте

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Вашим врачом будет подобрана подходящая Вам схема лечения.

Взрослые

При ишемическом инсульте

В течение первых 3-6 часов от развития инсульта назначают 1 г (4 таблетки) трансбуккально или сублингвально с 1 чайной ложкой воды, далее в течение 1-5 суток по 1 г/сут (по 4 таблетки), затем в течение последующих 30 суток по ½-1 таблетке 3 раза в сутки.

При различных функциональных и органических заболеваниях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна (неврозы, невротоподобные состояния, вегетосудистая дистония, последствия нейроинфекций и черепно-мозговых травм, перинатальные и другие формы энцефалопатий (в т. ч. алкогольного генеза))

По ½ таблетки 2-3 раза в день, курс лечения – 7-14 дней. Его можно увеличить до 30 дней. При необходимости курс повторяют через 30 дней.

При нарушениях сна назначают за 20 минут до сна или непосредственно перед сном по ¼-½ таблетки (в зависимости от возраста).

В наркологии

По ½ таблетки 2-3 раза в день в течение 14-30 дней. При необходимости курсы повторяют 4-6 раз в год.

Применение у детей и подростков

При различных функциональных и органических заболеваниях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности и нарушением сна (неврозы, неврозоподобные состояния, вегетососудистая дистония, последствия нейроинфекций и черепно-мозговых травм, перинатальные и другие формы энцефалопатий)

Дети до 3 лет

По ¼ таблетки 2 раза в день в течение 7-14 дней, в дальнейшем по ¼ таблетки 1 раз в день на протяжении 7-10 дней. Суточная доза – 100-150 мг, курсовая – 2-2,6 г.

Дети старше 3 лет

Режим дозирования для детей от 3 до 18 лет не отличается от режима дозирования для взрослых.

При девиантных формах поведения детей и подростков

По ½ таблетки 2-3 раза в день в течение 14-30 дней.

Путь и (или) способ введения

Препарат Глицин форте предназначен для подъязычного или защечного применения (в таблетках или в виде порошка после измельчения таблетки).

Не проглатывать и не жевать таблетку. В противном случае возникает угроза неэффективности препарата, поскольку препарат поступит в организм очень быстро.

Продолжительность терапии

Длительность применения обычно составляет 7–14 дней. При необходимости длительность применения может быть увеличена до 30 дней.

При необходимости курс повторяют через 30 дней.

В наркологии

Длительность применения обычно составляет 14–30 дней.

При необходимости курсы повторяют 4–6 раз в год.

Если Вы забыли принять препарат Глицин форте

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу препарата.

Если Вы прекратили прием препарата Глицин форте

Важно **окончить курс лечения**, даже если через несколько дней Вы почувствуете себя лучше.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Глицин форте может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Прекратите прием препарата Глицин форте и немедленно обратитесь за медицинской помощью, при возникновении симптомов серьезных нежелательных реакций:

Частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- аллергические реакции (затруднение глотания или дыхания; отек лица, губ, языка или глотки; зудящая сыпь (крапивница)).

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Глицин форте

Частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- сонливость.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза. Со-

общая о нежелательных реакциях, вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Телефон: +7 (800) 550-99-03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт: www.roszdravnadzor.gov.ru

5. Хранение препарата Глицин форте

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С во вторичной упаковке (пачке картонной).

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволяют защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Глицин форте содержит

Действующим веществом является глицин.

Каждая защитная таблетка содержит 250 мг глицина.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: аспартам (E951); коповидон; магния стеарат; сорбитол (E420).

Препарат содержит аспартам и сорбитол (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Глицин форте и содержимое упаковки

Таблетки защитные.

Препарат представляет собой таблетки круглые двояковыпуклые с крестообразной риской, белого или почти белого цвета. Допускается незначительная мраморность.

По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 30, 60 или 90 таблеток в банку полимерную для лекарственных средств из полиэтилена или полиэтилентерефталата. Крышка из полиэтилена или полипропилена.

По 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или по 1, 2, 3 контурных ячейковых упаковки по 30 таблеток, или по 1 банке полимерной для лекарственных средств вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково,

ул. Заречная, д. 105

Телефон: +7 (495) 797-99-54

Адрес электронной почты: safety@canonpharma.ru

Производитель

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, стр. 105Б, к. 11.

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ЗАО «Канонфарма продакшн»

141100, Московская обл., г.о. Щёлково, г. Щёлково,

ул. Заречная, д. 105

Телефон: +7 (495) 797-99-54

Адрес электронной почты: safety@canonpharma.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.